

СОРТИ ЩИРИЦІ ДЛЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА



Сорт «Кремівий ранній»



Сорт «Кармін»

Призначення

Для використання в аграрній галузі — одержання високоякісного білкового корму для сільськогосподарських тварин

Характеристики

Сорт «Кремівий ранній». Забарвлення рослин світло-зелене, під час досягання — кремове. Суцвіття розлоге. Урожайність — 100–110 т/га зеленої маси. Олиственість — 36 %. Період вегетації до повної стиглості насіння 90–100 діб. Насіння світле.

Сорт «Кармін». Суцвіття яскраво-пурпурове, розлоге. Урожайність — 100–110 т/га зеленої маси. Олиственість — 35 %. Період вегетації до повної стиглості насіння 90–100 діб. Насіння світле.

Сорт «Стерх». Суцвіття під час досягання коралового кольору, компактне. Урожайність — 110–120 т/га зеленої маси. Олиственість — 40 %. Період вегетації до повної стиглості насіння 130–135 діб. Насіння світле.

Сорти занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні



Сорт «Стерх»

Переваги

Зелена маса порівняно із традиційними кормовими культурами, краща за вмістом високолізинового білка, біологічно активних сполук, кальцію, калію та магнію. Збирається впродовж тривалого періоду (липень — вересень)

Рівень готовності розробки. Пропозиції до комерціалізації

IRL3, TRL3

Укладання ліцензійних угод на використання сортів для промислового виробництва. Надаються посівний матеріал і консультації щодо вирощування рослин

Охорона інтелектуальної власності

IPR3

Контактна інформація

Рахметов Джамал Бахлулович, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, +38 044 285 01 20, e-mail: jamal_r@bigmir.net